SAVIEZ-VOUS QUE...

LE BLEUETIER

Les myrtilles sont l'une des rares espèces de fruits originaires d'Amérique du Nord et ont une histoire colorée datant de l'époque pré-coloniale. Le bleuet a été recueilli et utilisé par les Amérindiens pendant des siècles avant l'arrivée des colons d'Europe.

Le myrtille était sacré pour les Indiens en partie parce que la fin de la baie était en forme d'étoile à cinq pointes. Les Indiens croyaient que les baies ont été envoyées par le Grand Esprit pendant une grande famine pour soulager la faim de leurs enfants. Lorsque les colons anglais sont arrivés en Amérique, ils ont essayé de mettre en œuvre des pratiques agricoles anglaises. Associé à une tentative de vie communautaire, cela s'est avéré désastreux.

Les colons de la Nouvelle-Angleterre sont presque morts de faim jusqu'à ce que les Indiens s'en mêlent et leur enseigne comment conserver les fruits durant l'hiver. Les myrtilles utilisées par les Indiens étaient indigènes.

Aujourd'hui, la plupart des bleuets qui sont cultivées sont la variété qui pousse dans les buissons qui a été domestiquée au début du 20e siècle par Elizabeth White et le Dr Frederick Coville. Depuis lors, la culture a eu tellement de succès que l'Amérique participe à plus de 90% de la production mondiale.

BLEUET EN CORYMBE OU BLEUET NAIN?

LE BLEUETIER EN CORYMBE

Les bleuets en corymbe sont moins résistantes au froid, mais plus tolérantes à la chaleur. Ils grandissent beaucoup plus haut que les variétés naines, et se développent comme un véritable buisson. La hauteur varie selon les différentes variétés et peut atteindre jusqu'à 12 pied. Les fruits seront de bon calibre avec une très bonne qualité. La taille, saveur et texture des fruits varieront considérablement selon les différents cultivars.

LE BLEUETIER NAIN

Les bleuets nains se retrouvent le plus au Nord et de ce fait, ils seront moins tolérants à la chaleur. Le plant atteint environ 45 cm ce qui en fait un excellent couvre sol. Il peut donc être utilisé dans l'aménagement paysager comme un revêtement de sol ornemental. Les bleuets ont tendance à être de calibre moyens, mais doux et intensément savoureux.

CHOIX ET PRÉPARATION DU SITE DU BLEUET EN CORYMBE

Le bleuetier en corymbe n'est pas tellement rustique; les bourgeons à fruit sont endommagés par des températures hivernales de -32°C. Les bons sites à vergers sur le flanc des montagnes demeurent les endroits les plus propices à la culture.



Billonage pour la culture de la framboise (gauche) et du bleuet (droite).

On peut aussi avoir du succès dans des sites plus froids, mais abrités du vent ou avec des plants moins hauts et mieux protégés par la neige. Le choix du cultivar devient alors critique et important. Ainsi, la majorité du fruit proviendra des premiers 65 cm à la base du plant et ces plants devront être taillés en conséquence.

Le bleuetier a des exigences assez différentes des plantes communément cultivées. Planter seulement en sols légers et acides (pH idéal est 4.8) quoique des amendements organiques peuvent améliorer d'autres types de sols.

Avant de planter, faire une tranchée sur toute la longueur du rang et remplir de mousse de tourbe. À l'aide d'un rotoculteur, mélanger cette dernière avec un peu de sol sous-jacent. Si le site choisi est mal drainé, appliquer tout simplement la mousse de tourbe en surface de façon à obtenir une plate-bande surélevée.

LA PLANTATION ET L'ENTRETIEN DU BLEUET EN CORYMBE

Planter le bleuetier en corymbe à 1.3-1.5 m sur des rangs espacés de 2.5-3.0 m. Pour obtenir de plus gros fruit, planter un minimum de 3 variétés pour la pollinisation. Planter profondément de façon à ce que les premiers 5 à 8 cm de la base des tiges soient bien recouverts. Irriguer abondamment après la plantation.

Le bleuetier est une plante de sols pauvres qu'on endommage souvent plus par excès de fertilisation. N'appliquer aucun engrais à la plantation, mais fertiliser 2 semaines plus tard. Pour de petites plantations, utiliser du (30-10-10) à base de sulfate d'ammoniaque. Pour les plantations commerciales, répandre 25 g de sulfate d'ammoniaque (21-0-0) sur un diamètre de 30 à 60 cm autour de chaque plant. Les années subséquentes, fertiliser à partir de la fin avril début mai. Répéter aux 3 semaines (mais jamais plus tard que le début juillet) surtout si un paillis de bran de scie est utilisé. Augmenter graduellement la dose selon les besoins tout en n'excédant pas 100-125 g par plant par année. En fin d'été et automne on peut fertiliser avec du Sulfate de potassium et de magnésium (SulPoMag) dans les mêmes quantités.

Garder une humidité de sol constante. Le bleuetier ne tolère pas les excès ou les manques d'eau. Un paillis de bran de scie de 5 à 8 cm est tout à fait indiqué. Il est fortement recommandé d'avoir un système d'irrigation lors de l'implantation d'une bleuetière . Enlever les grappes de fleurs qui apparaissent durant les 2 premières saisons. Après quelques années, tailler en fin d'hiver en enlevant les plus vieilles tiges à ras de sol. Pour une qualité de fruit supérieure, cueillir seulement une fois par semaine.

L'utilisation des filets contre les oiseaux est à considérer ainsi que des clôtures pour protéger des chevreuils le cas échéant. Dès la fin de la récolte débuter la pose de station appât contre les rongeurs et poursuivre tout au long de l'hiver. (Facultatif).

CHOIX ET PRÉPARATION DU SITE DU BLEUET NAIN

Le bleuet nain a les mêmes exigences de sol que la bleuetière en corymbe, mais malgré son adaptation au climat nordique, il n'est pas aussi rustique, il a donc besoin de la protection de la neige ou d'un paillis l'hiver.

Cette exigence n'est toutefois pas trop difficile à rencontrer, le plant dépassant rarement 30-40 cm de hauteur.

PLANTATION ET ENTRETIEN DU BLEUET NAIN

Pour la plantation et l'entretien, procéder comme pour la bleuetière en corymbe. Le type nain est planté à 40-60 cm sur les rangs espacés de 1,5M.

Après quelques années, lorsque les plants manquent de vigueur, tailler complètement les bleuetières nains à ras de tôt au printemps avec un sécateur ou une tondeuse rotative dont la lame est bien aiguisée. Une saison sans production suivra, mais les récoltes futures n'en seront que plus importantes.

CULTURE EN POT DU BLEUETIER EN CORYMBE

La culture en pot se développe de plus en plus. Elle permet l'utilisation de variété moins rustique et plus productive.

Les compagnies de substrat commercial ont développé des expertises pour vous conseiller dans le choix des substrats.

Les terreaux utilisant bien sûr la mousse de tourbes, mais aussi des écorces compostées sont à essayer.

L'utilisation des composts et des engrais à libération contrôlés sont à utiliser avec précautions.

Le bleuetier a un système racinaire fragile sans poils absorbants tels que rencontrés chez la plupart des plantes.

Cela le rend plus dépendant de l'irrigation régulière et l'apport de fertilisant peu concentré.